

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DE LOS OVINOS PRECOSES

M. Espejo*

M. Izquierdo*

D. Albardonedo**

* SIA, Junta de Extremadura
Apartado 22, 06080- Badajoz

** AECOP. Castelló, 45
28001-Madrid

El esquema de selección de ovinos precoces incluye varias razas de actitud cárnica como son Ile de France, Merino Precoz, Berrinchon, Fleisschaf, Landschaf y últimamente se ha incorporado el único rebaño de Charmoir. Los controles de campo se empezaron en 1993 y actualmente se dispone de una base de datos desde 1993 a 1996. De cada raza se controlan datos de paridera, como fecha de nacimiento, sexo del cordeiro, modo de nacimiento y el peso al nacimiento, que es voluntario. Además se controla la identificación de la madre y del padre y se pesan al menos dos veces, una antes de los 30 días de edad y otra entre los 30 y 70 días. Los pesos se tipifican a 30 y 70 días y se calculan las ganancias medias diarias entre 0 y 30 días y 30 y 70 días.

Los principales problemas que existen a la hora de evaluar genéticamente los animales es la desconexión entre los rebaños, ya que aunque se están realizando inseminaciones artificiales en las ganaderías inscritas al esquema de selección, hay que usar bastantes machos y todavía es pronto para poder realizar evaluaciones genéticas comparando ganaderías. Este año se han evaluado las conexiones y se va a realizar una evaluación entre-rebaño para cada raza. Se aconsejará una pauta más severa de conexión, para poder realizar el año que viene una evaluación global.

El programa de selección aprobado oficialmente en diciembre de 1992 preveía la realización de pruebas de descendencia en estación de testaje. El objetivo de esta prueba es determinar las características cárnicas de animales que ya han sido seleccionados por sus características de crecimiento (pesos a 30 y 70 días de edad).

Entre el 20 de octubre de 1994 y el 20 de junio de 1995, la primera prueba en la que se testaron 8 machos Merino Precoz, 5 machos Ile de France, 2 machos Berrinchon y 2 machos Fleisschaf. Durante la cubrición se tuvieron esatabulados cada macho con 20 ovejas merinas (excepto los Merino Precoz que se tuvieron con hembras de igual raza). Se controlaron los crecimientos de los corderos en cebadero hasta el sacrificio que se realizó cuando los machos alcanzaron los 23 kg y las hembras los 21 kg. Sobre las canales se determinaron el rendimiento, el estado de engrasamiento y la conformación según las normas de la UE. Con los resultados de las producciones de la descendencia se calculó para cada carnero un índice de crecimiento, un índice de calidad de la canal y un índice conjunto. Se observaron diferencias significativas en las características cárnicas de los machos testados.